

广东省药学会文件

粤药会〔2022〕113号

关于发布《JAK 抑制剂临床用药指引》的通知

各相关单位：

近年来 JAK 抑制剂通过 JAK 激酶和信号转导与激活转录信号参与了多种免疫介导炎症性疾病，已在特异性皮炎、类风湿关节炎、炎症性肠病和骨髓增生性肿瘤等多种疾病的临床治疗中呈现显著的疗效，但同时也存在潜在安全性和局限性。为便于临床药师掌握国内上市 JAK 抑制剂的药学相关特征和现有临床证据，更好地服务临床药学监护，中山大学孙逸仙纪念医院药学部和本会召集全国相关专家编写了《JAK 抑制剂临床用药指引》。

本指引从临床应用角度，详细介绍了 JAK 抑制剂的作用机制、国内上市五种 JAK 抑制剂的适应证、药代动力学特征、用法用量、用药监护和安全性检测，结合国内外权威指南与说明书重点阐述了 JAK 抑制剂的临床应用与注意事项，旨在为各医疗单位临床使用 JAK 抑制剂提供参考和指导性意见。

本共识已通过《今日药学》杂志在中国知网优先发表，引用格式为：[1] 广东省药学会.JAK 抑制剂临床用药指引[J/OL].今日药学:1-31[2022-11-30].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1650.R.20221129.1120.002.html>。

现予以发布，供各相关单位参考。各单位在执行过程中遇到任何问题，请及时向本会或中山大学孙逸仙纪念医院药学部反映。

学会联系地址：广州市东风东路 753 号东塔 701 室 广东省药学会
510080

联系电话：（020）37886326，37886321

传真：37886330

电子邮箱：gdsyxh45@126.com

网址: <http://www.sinopharmacy.com.cn>

中山大学孙逸仙纪念医院联系地址: 广州市越秀区沿江西路 107 号 中山大学孙逸仙纪念医院药学部 510120

联系人及电话: 汪梦 (020) 81332427

电子邮箱: whitneywm@163.com

附件:

- 1、《JAK 抑制剂临床用药指引》起草专家组
- 2、《JAK 抑制剂临床用药指引》(以上附件请在本会网站“下载专区”下载)



《JAK 抑制剂临床用药指引》

起草专家组

医学顾问:

戴冽 中山大学孙逸仙纪念医院 主任医师

执笔:

伍俊妍 中山大学孙逸仙纪念医院 主任药师

邱凯锋 中山大学孙逸仙纪念医院 主任药师

药学专家 (以姓氏拼音为序):

陈杰 中山大学附属第一医院 主任药师

冯昌文 肇庆市第一人民医院 主任药师

季波 南部战区总医院 主任药师

黎小妍 中山大学附属第六医院 主任药师

刘东 华中科技大学同济医学院 主任药师

刘韶 中南大学湘雅医院 主任药师

吕永宁 华中科技大学附属同济医学院协和医院 主任药师

麦海燕 中山大学附属第三医院 主任药师

梅清华 广东省第二人民医院 主任药师

莫小兰 广州市妇女儿童医疗中心 主任药师

彭晓青 广州市第一人民医院 主任药师

王景浩 暨南大学附属第一医院 主任药师

王立军 北京大学深圳医院 主任药师

王若伦 广州医科大学附属第二医院 主任药师

魏理 广州医科大学附属第一医院 主任药师

吴建龙 深圳大学附属第一医院 主任药师

谢凯 广东省皮肤病医院 主任药师

谢守霞 深圳市人民医院 主任药师

杨西晓 南方医科大学深圳医院 主任药师

曾英彤 广东省人民医院 主任药师

张毕奎	中南大学湘雅二医院	主任药师
左笑丛	中南大学湘雅三医院	主任药师
秘书:		
汪梦	中山大学孙逸仙纪念医院	药师